

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DU NORD-OUEST (Tél. Arras 23-14)

(SEINE-MARITIME, SOMME, PAS-DE-CALAIS, NORD)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux.

C. C. P. : ULLE 57-01-67

ABONNEMENT ANNUEL

~~12XXX~~ 15 F

Supplément n° 2

N° XXXIV - 23 Juillet 63

AVERTISSEMENTS

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

L'évolution de la maladie a été lente ces derniers jours sauf dans les Flandres et la Seine-Maritime touchés par une forte pluie le 13 Juillet. Cependant, les rosées sont suffisantes pour l'extension des taches sur les pieds infestés bien qu'une pluie abondante soit nécessaire pour provoquer des repiquages à distance.

La situation varie suivant les régions et les traitements effectués. Les champs situés dans les zones les plus sensibles cette année (Flandres, Cambrésis, Artois, Santerre et régions littorales) et traités seulement à partir du 30 juin sont en général très infestés.

Deux objectifs, presque contradictoires, sont à envisager maintenant : d'une part, faire durer une végétation active pour augmenter au maximum les rendements ; d'autre part, éviter le mildiou sur tubercules. Or, plus on prolonge la végétation même avec un mildiou assez faible sur feuilles, plus les risques de contamination des tubercules sont grands, celles-ci se réalisant en général au cours de fortes pluies et à partir des spores présentes sur les feuilles.

En conséquence,

1) Champs de Bint'je presque indemnes de mildiou (moins de 1 tache pour 10 pieds)

Un nouveau traitement doit être appliqué dès réception de cet avis et sera suivi, si la maladie ne s'étend pas de trop, par une autre intervention effectuée vers le 5 août. Bien entendu, un renouvellement immédiat doit être prévu en plus après chaque forte pluie lessivante.

A partir de la mi-août, ou, dès la généralisation éventuelle des taches dans la pièce, il sera prudent d'opérer un défanage immédiat (en particulier cette année, il semblerait dangereux de négliger la surveillance des champs pendant la moisson).

2) Champs moyennement atteints (de l'ordre de 1 tache par pied)

Si un rendement correct n'est pas encore atteint (surtout plantations de Bint'je de la 2ème quinzaine d'avril ou du début-mai) un nouveau traitement appliqué dès réception de cet avis peut prolonger la végétation active d'une dizaine de jours. Mais il faut savoir que l'on prend alors le risque d'une infection des tubercules si une grosse pluie survient. La prudence commande donc d'opérer un défanage rapide dès qu'un rendement satisfaisant est atteint.

3) Champs très atteints (plus de 5 taches par pied)

La végétation de ces champs se ralentit de plus en plus et les augmentations possibles de rendements à prévoir sont faibles. Les risques de "gâte" des tubercules sont importants. Seul, un défanage rapide paraît devoir être conseillé.

Remarques -

- Variétés hâtives : le défanage est plus opportun qu'un nouveau traitement
- Variétés féculières : leur protection doit être poursuivie au moyen de traitements effectués au moins tous les 15 jours.

INFORMATIONS

CERCOSPORIOSE DE LA BETTERAVE

Aucun traitement ne semble justifié dans l'immédiat.

RAPPELS - CARPOCAPSE DES FRUITS A PEPINS : URGENT

- OIDIUM DU POMMIER.

Le Contrôleur : R. DIVOUX

L'Inspecteur : P. COUTURIER